



BiodiversityWorks

pesquisa, monitoramento, e acompanhamento de animais selvagens

Cobras de Martha's Vineyard



Cobra Verde Áspera

Opheodrys vernalis

12 - 24 polegadas

- encontrada em habitats abertos
- se alimenta de aranhas, lagartas e outras espécies de insetos
- incuba ovos internamente parcialmente, e então os deposita entre junho e setembro

Cobra do Leite

Lampropeltis triangulum

24 - 48 polegadas

- a coloração pode variar, mas as manchas na parte dorsal têm bordas pretas
- pode ser encontrada geralmente entre paredes de pedra, celeiro, pilhas e fundações de madeira.
- se alimenta de pequenos mamíferos (ratos)
- deposita ovos entre junho e julho



Cobra-anel-no-pescoço

Diadophis punctatus

9 - 20 polegadas

- coloração amarela/laranja vibrante na parte ventral, e possui um “anel” em volta do pescoço
- encontrada em áreas úmidas de habitats florestados e em porões úmidos
- se alimenta de pequenas salamandras, lesmas, insetos e minhocas
- deposita ovos entre junho e julho

Cobra de Ventre Vermelho

Storeria occipitomaculata

8 - 12 polegadas

- coloração da parte dorsal marrom-avermelhada, cinza ou preta, com parte ventral vermelha ou laranja
- encontrada tipicamente em bosques
- se alimenta de lesmas, minhocas e sapos
- deposita ovos internamente e libera indivíduos jovens entre no final de julho e setembro





J. Mays

Cobra com faixa

Thamnophis sauritus

18 - 36 polegadas

- possui cauda longa e três faixas grossas
- pode ser encontrada perto de brejos rasos, lagos e mangues
- se alimenta de sapos, peixes pequenos e salamandras
- incuba ovos internamente e dá à luz a indivíduos jovens entre agosto e setembro

Cobra Garter

Thamnophis sirtalis

18 - 40 polegadas

- coloração altamente variável e pode apresentar ausência de faixas
- muito comum e encontrada em uma variedade de habitats.
- se alimenta de minhocas, salamandras, insetos, sapos, peixes, pássaros e pequenos mamíferos
- incuba ovos internamente e dá à luz a indivíduos jovens entre julho e agosto



J. Mays



Adulto

B. Clifford



Jovem

Cobra Corredora

Coluber constrictor

36 - 60 polegadas

- cobra grande, preta, com queixo e garganta brancos
- indivíduos jovens com coloração uniforme na cauda
- ativa durante o dia em pastagens, regiões arbustivas e ao redor de habitats florestados
- se alimenta de ratos e outros mamíferos pequenos, insetos, sapos, outras cobras, filhotes e ovos de pássaros
- deposita ovos entre junho e julho
- populações estão em declínio

Salve Nossas Cobras

- Todas as cobras de Martha's Vineyard são inofensivas.
- Elas não mordem, a não ser que você as segure.
- Cobras se alimentam de ratos, lesmas e insetos que são pragas em nossos quintais e jardins.

Informe-nos quando você vir uma cobra

Você pode mapear os lugares onde você viu cobras em nosso website

www.biodiversityworksmv.org/snakes